INFORMAZIONI ESAMI

Specialità: Endoscopia Digestiva
Esame: Rettocolonscopia

RETTOCOLONSCOPIA C.C.MONTANARI

PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME E' INDISPENSABILE PRESENTARSI CON I SEGUENTI ESAMI DI LABORATORIO (recenti):
emocromo con piastrine
tempo di Quick
PTT
INR

MODALITA' DI PREPARAZIONE

Acquistare in farmacia n° 8 buste di ISOCOLAN da 34,8g.

PER CHI ESEGUE L'ESAME AL MATTINO

Il giorno precedente l'esame è consentito un pranzo privo di frutta e verdura. Per la cena NON ASSUMERE CIBI SOLIDI, SI PUO' BERE eccetto succhi di frutta e spremute.
Dalle ore 20:00 sciogliere le 8 buste di ISOCOLAN in 4 lt. d'acqua (ogni busta in ½ lt d'acqua) e iniziare a bere il preparato terminandolo in circa 4 ore.

PER CHI ESEGUE L'ESAME DI POMERIGGIO

Il giorno dell'effettuazione dell'esame ALLE ORE 7 DEL MATTINO fare sciogliere le 8 buste di ISOCOLAN in 4 lt. D'acqua (ogni busta in ½ lt. Di acqua) e iniziare a bere il preparato terminandolo in circa 4 ore. Per il pranzo NON ASSUMERE CIBI SOLIDI, SI PUO' BERE eccetto succhi di frutta e spremute.

Mediamente l'inizio della diarrea, che risulterà abbondante e solitamente non accompagnata da dolore, avverrà dopo circa 1 ora e mezzo dall'inizio della somministrazione.
Si consiglia di sospendere l'assunzione del prodotto in caso di vomito.

RICORDARSI DI:

- PORTARE REFERTI DEGLI ESAMI DEL SANGUE ESEGUITI;
- PORTARE ESAMI RADIOLOGICI E REFERTI DI COLONSCOPIE PRECEDENTI;
- PORTARE L'IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE;
- SEGNALARE EVENTUALI MALATTIE, ALLERGIE, ASSUNZIONI DI FARMACI E LA PRESENZA DI PACE-MAKER;
- ESSERE ACCOMPAGNATI DA QUALCUNO CHE POSSA ACCOMPAGNARVI A CASA

CASA DI CURA PRIVATA ERNESTO MONTANARI	RETTOCOLONSCOPIA Preparazione con Isocolan	**M 15/08** **Rev 1**

IMPORTANTE:

In corso di esame possono essere somministrati farmaci sedativi allo scopo di rendere la colonscopia più confortevole. Per tale motivo dopo l'esame è vietato guidare l'automobile ed è necessario essere accompagnati.

I Pazienti devono **assumere regolarmente la terapia abituale, anche se al mattino assumeranno la soluzione per la preparazione intestinale.**

I Pazienti diabetici che assumono ipoglicemizzanti orali o insulina devono consultare il proprio Medico per regolare l'assunzione di tali farmaci durante la preparazione dell'esame.

I Pazienti che assumono anticoagulanti orali devono segnalarlo al Medico che esegue l'esame e devono consultare il proprio Medico curante per l'eventuale sospensione e/o sostituzione; tali farmaci debbono essere sospesi alcuni giorni prima se è in programma una procedura operativa (ad esempio polipectomia).

I Pazienti portatori di protesi valvolari cardiache o pace-maker devono segnalarlo al medico che esegue l'esame.

I Pazienti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate, iniziando una **dieta priva di scorie** (frutta, verdura, alimenti integrali) **4 giorni prima** della data dell'esame.

E' NECESSARIO PORTARE CON SE' L'ESITO DEGLI ESAMI PER LA DETERMINAZIONE DI: EMOCROMO, PT, PTT, INR. GLI ESAMI DEVONO ESSERE ESEGUITI ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELL'INDAGINE ENDOSCOPICA.

E' NECESSARIO PORTARE CON SE' GLI ESAMI RADIOLOGICI PRECEDENTI E LA RICHIESTA MEDICA IN CUI SONO SPECIFICATE LE INDICAZIONI DELL'ESAME.

Non è necessario sospendere le terapie croniche. Si prega di contattare il nostro servizio per un colloquio con il medico specialista in caso di terapia cronica antiaggregante o anticoagulante.

L'assunzione di farmaci anti-infiammatori (aspirina e simili) **deve essere sospesa temporaneamente** a partire da **5 giorni prima** dell'indagine endoscopica.

Se non sono in corso terapie con anti-infiammatori, antiaggreganti o anticoagulanti, sono ritenuti **validi gli esami ematochimici recenti** (eseguiti entro 15 giorni prima dell'indagine endoscopica).

In caso di gravi patologie renali o cardiocircolatorie, si prega di **contattare il nostro servizio** prima di iniziare la preparazione.