



CASA DI CURA PRIVATA ERNESTO MONTANARI

RETTOCOLONSCOPIA Preparazione con Lovol

M 15/11
Rev. 1

INFORMAZIONI

Specialità : Endoscopia Digestiva

Esame : Rettocolonscopia

RETTOCOLONSCOPIA

Il buon esito dell'esame cui si deve sottoporre dipende, in larga misura, da una buona pulizia del suo intestino

Un intestino perfettamente pulito permette, infatti, al medico di eseguire un esame più accurato, più rapido e, per Lei, meno fastidioso

Da qui l'importanza che segua, accuratamente, alcune raccomandazioni e istruzioni

PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME E' INDISPENSABILE PRESENTARSI CON I SEGUENTI ESAMI DI LABORATORIO (eseguiti almeno quindici giorni prima dell'indagine endoscopica) :

emocromo con piastrine

tempo di Quik

PTT

INR

PREPARAZIONE A BASSO VOLUME - ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

Acquistare in farmacia (anche senza ricetta medica)

Lovoldyl 5 mg – 4 compresse rivestite (bisacodile) e Lovol-esse

COSA FARE UNA SETTIMANA PRIMA DELL'ESAME

. I pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti (ad es. Sintrom, Cumadin etc.) devono contattare il medico di medicina generale per l'eventuale variazione del dosaggio

. I pazienti diabetici che assumono insulina o altri farmaci devono contattare il medico di medicina generale o il Diabetologo per un'eventuale variazione della terapia

. Tre giorni prima dell'esame iniziare una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, cibi integrali)

. Il giorno che precede l'esame a colazione si possono assumere caffè, tè, miele, zucchero, biscotti o fette biscottate non integrali e senza semi; a pranzo si può mangiare un semolino o un brodo di carne, qualche biscotto non integrale e senza semi, uno yogurt senza frutta in pezzi o semi; a cena si può assumere un brodo di carne.

. Durante la preparazione all'esame e anche il giorno stesso, si possono continuare le eventuali terapie in corso, mantenendo un intervallo di 1-2 ore tra l'assunzione di farmaci per via orale e l'assunzione di **LOVOL®-esse**.

. Sciogliere ogni busta di **LOVOL®-esse** in 500 ml di acqua naturale, ottenendo così 2 litri di soluzione. Si consiglia di raffreddare la soluzione così ottenuta per renderla più gradevole.

La preparazione a base di **bisacodile - 5 mg compresse rivestite (es: Lovoldyl)** e di **LOVOL®-esse** deve essere eseguita secondo la descritta modalità:

MODALITÀ

Il giorno prima dell'esame, assumere le 4 compresse di bisacodile nel primo pomeriggio (ore 14:00 circa), quindi, dopo almeno 4 ore (18:00-20:00), iniziare a bere LOVOL®-esse. Bere 250 ml di soluzione ogni 15-20 minuti, fino ad esaurimento della stessa.



RETTOCOLONSCOPIA Preparazione con Lovol

M 15/11
Rev. 1

- . È possibile bere acqua non gassata, tè o tisane (anche zuccherati) fino a 2 ore prima dell'esame, salvo diversa indicazione medica.
- . Possono comparire gonfiore o distensione addominale prima della prima evacuazione. Se il gonfiore diventa fastidioso, si consiglia di interrompere temporaneamente l'assunzione della soluzione o di allungarne gli intervalli (30 minuti anziché 15-20).
 - . La preparazione a base di **bisacodile e LOVOL®-esse** determina la comparsa di evacuazioni liquide, generalmente dopo un'ora dall'inizio dell'assunzione di **LOVOL®-esse**.
- . L'eventuale comparsa di nausea non è un fenomeno preoccupante
- . Si deve assumere tutto il prodotto altrimenti l'esame non potrà essere eseguito
- . Durante l'assunzione del preparato non è concesso mangiare.

AVVERTENZE PARTICOLARI

I pazienti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate

- . Portare referti degli esami del sangue eseguiti
- . Portare esami radiologici e referti di colonscopie precedenti
- . Portare l'impegnativa del medico curante
- . Segnalare eventuali malattie, allergie, assunzioni di farmaci e la presenza di pace-maker e valvole cardiache
- . **Se si assumono farmaci anticoagulanti, insulina o terapie per il diabete, contattare il proprio specialista o Medico di Medicina Generale o il centro di Endoscopia almeno 7 giorni prima dell'esame per l'eventuale sospensione e/o sostituzione ; tali farmaci debbono essere sospesi alcuni giorni prima se è in programma una procedura operativa (es polipectomia)**
- . L'eventuale somministrazione di sedativi in corso di esame può provocare sonnolenza.
 - . **Si raccomanda, pertanto, di evitare la guida di veicoli dopo l'esame ed è necessario essere accompagnati !**
- . Non è necessario sospendere le terapie croniche. Si prega di contattare il nostro servizio per un colloquio con il medico specialista in caso di terapia cronica antiaggregante o anticoagulante
- . **L'assunzione di farmaci anti-infiammatori (aspirina o simili) deve essere sospesa temporaneamente a partire da 5 giorni prima dell'indagine endoscopica**
- . Se non sono in corso terapie con anti-infiammatori, antiaggreganti o anticoagulanti, sono ritenuti validi gli esami ematochimici recenti (eseguiti entro 15 giorni prima dell'indagine endoscopica)
- . In caso di gravi patologie renali o cardiocircolatorie, si prega di contattare il nostro servizio prima di iniziare la preparazione