



## PROLASSO RETTALE COMPLETO

MC 12/34 C  
Rev. 1

Nome e Cognome del Paziente \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

Gentile Signora/e,

questo foglio illustrativo è stato realizzato per dare ai pazienti una serie di informazioni utili per affrontare con maggiore serenità l'impegno che li aspetta.

Un paziente ben informato, un colloquio approfondito ed esauriente con i medici che lo seguiranno sono parte integrante dell'iter terapeutico.

Nel caso le informazioni contenute in questo foglio informativo Le suscitino altre domande, non esiti a sottoporle al medico di riferimento.

### OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il prolasso rettale consiste nella fuoriuscita di una parte o di tutto il retto dall'ano. Nel caso in cui il retto prolassi ma non sia evidente all'esterno dell'ano il prolasso si definisce interno e può prendere il nome di intususcezione rettale. E' un'alterazione statico-funzionale ano-rettale che comporta disturbi più o meno accentuati della defecazione.

Esistono diversi interventi per il trattamento del prolasso rettale completo che possono essere eseguiti per via addominale o perineale.

Nel primo caso esistono molte varianti tecniche che prendono il nome dal chirurgo che le ha ideate (Orr-Loygue, Wells, Ripstein, ecc) ma l'obiettivo di tutte è quello di isolare il retto e di ancorarlo al sacro (**RETTOPESSI**); nella maggior parte dei casi questo avviene con una protesi (rete). Quando il colon è molto lungo all'intervento di fissaggio può associarsi a una resezione del sigma.

Nel secondo caso l'intervento viene eseguito per via trans-ale senza incisione addominale. Esistono essenzialmente due metodiche: l'intervento d'**Alteimer (RETTOSIGMOIDECTOMIA PERINEALE)** che prevede una resezione del retto e del sigma per via trans-ale con ripristino della continuità intestinale mediante anastomosi colo-ale e il **intervento di Delorme** che consiste in una asportazione della mucosa rettale con plicatura della muscolare ed ancoraggio all'ano. Questi interventi sono meno invasivi ma gravati da un'elevata incidenza di recidiva (30-50%).

### MODALITA', TEMPI DI ESECUZIONE, EVENTUALI SINTOMI INDOTTI

L'intervento di rettopessi per via addominale viene eseguito in anestesia generale. L'intervento per via perineale può essere eseguito in anestesia spinale o generale. Gli interventi per via addominale possono essere eseguiti per via **Laparoscopica**, cioè mediante 4-5 piccole incisioni di circa 0.5-1,5 cm sulla parete addominale attraverso le quali si gonfia l'addome con un gas inerte (CO<sup>2</sup>) e si fanno passare una telecamera e gli strumenti chirurgici necessari per l'esecuzione dell'intervento e un'incisione addominale di circa 7-10 cm (in sede variabile) per l'estrazione del pezzo asportato o per via **Laparotomica**, ovvero con l'esecuzione di una incisione chirurgica classica di varia estensione in sede mediana. L'approccio laparoscopico deve sempre contemplare la possibilità di convertire la procedura dalla tecnica laparoscopica a quella laparotomica in itinere per qualsiasi motivo precluda o renda rischioso portare a termine l'intervento. In alcuni casi la tipologia di intervento può essere modificata, nell'interesse del paziente, in relazione a particolari aspetti non riscontrati negli esami preoperatori, associando ad esempio eventuali resezioni di altri organi interessati dalla malattia o da patologie concomitanti.

I tempi delle procedure sono variabili ma solitamente durano diverse ore (1-3 h circa). Al risveglio terminate le procedure chirurgiche al paziente saranno già stati posti in sede il catetere vescicale, il sondino naso-gastrico e dei drenaggi addominali; questi presidi verranno rimossi giorni dopo l'intervento. L'alimentazione verrà ripresa gradualmente con il passare dei giorni in base alla ripresa dell'attività intestinale. Il periodo postoperatorio sarà caratterizzato dalla presenza di una sintomatologia dolorosa che verrà controllata farmacologicamente.

### RISCHI E COMPLICANZE

E' comprensibile che, come tutte le procedure chirurgiche, tali interventi portino con sé un rischio intrinseco, legato all'intervento stesso e/o alla presenza di varianti anatomiche intraaddominali non prevedibili preoperatoriamente e/o di patologie concomitanti.

Si puntualizza, inoltre, che le complicanze esplicitate in questo foglio informativo, logicamente, rappresentano solamente una parte di tutte le problematiche che ogni singolo paziente potenzialmente può sviluppare come conseguenza della malattia da trattare, delle patologie concomitanti, della/e procedure chirurgiche e della sua situazione clinica al momento del ricovero.

Le possibili principali e più frequenti complicanze sono:



**CONSENSO INFORMATO**

UN DOVERE VERSO IL PAZIENTE  
UNA RESPONSABILITA' CHE CI ASSUMIAMO VOLENTIERI

- **emorragia ed ematomi postoperatori**, nonché **lesioni dei grossi vasi addominali** che potrebbero comportare la necessità di un reintervento a scopo emostatico, ovvero di emotrasfusioni, con il relativo rischio infettivo logico;
- **complicanze settiche** da inquinamento intraoperatorio;
- **lesioni ureterali**: possono richiedere il posizionamento di un drenaggio ureterale e/o un intervento ricostruttivo;
- **deiscenza anastomotica**, nei casi con resezione associata, con possibilità di fistole enteriche e talora necessità di reintervento;
- **insorgenza di stenosi cicatriziale dell'anastomosi**, nei casi con resezione associata, che spesso può essere risolta con semplici dilatazioni per via endoscopica senza richiedere un reintervento;
- **ricidiva del prolasso**: è in relazione alla tecnica chirurgica impiegata. Se si utilizza la rettopessi l'incidenza è inferiore al 10%; negli interventi per via perineale può arrivare sino al 30-50%;
- **aderenze** che si possono formare in cavità addominale ed in casi estremi causare una occlusione intestinale precoce o tardiva che può richiedere un intervento chirurgico.
- **infezione di ferita**;
- **enfisema (presenza di gas) sottocutaneo** (in caso di tecnica laparoscopica);
- **insorgenza di trombosi venose profonde ed eventuali embolie polmonari**;
- **formazione di aree atelettasiche o di addensamento polmonare** con successivi infettivi a carico dei polmoni ed eventuale versamento pleurico;
- **laparocele**: ernia dalle ferite chirurgiche dovuta a deiscenza della fascia muscolare;
- **aggravamento della stipsi**;
- **incontinenza anale**.

### INDICAZIONI E VANTAGGI

Il fine del trattamento chirurgico è duplice: da un lato correggere il prolasso e dall'altro ripristinare la funzionalità ano-rettale compromessa dalla/e alterazioni anatomo-funzionali.

Sebbene ogni tipologia d'intervento venga proposta dopo lo studio del singolo caso, nei pazienti giovani o in buone condizioni generali è sempre indicata una rettopessi per via addominale. Se è presente una stipsi importante è possibile associare una resezione del sigma per correggerla. Nei pazienti con scadute condizioni generali o anziani può essere indicato il trattamento con accesso perianale, generalmente secondo la tecnica di Delorme.

### ALTERNATIVE POSSIBILI

Non esistono terapie alternative alla chirurgia per la guarigione del prolasso rettale. Con la terapia medica di supporto si può tentare di controllare la sintomatologia e le eventuali complicanze, ma non si può arrivare alla guarigione del caso.

### LE EVENTUALI VARIAZIONI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Presentandosi la necessità di salvare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile o da un danno grave alla persona, o se si constatassero difficoltà ad eseguire l'intervento chirurgico, con la tecnica proposta, verranno poste in atto tutte le pratiche che i sanitari curanti riterranno idonee a scongiurare o limitare tale pericolo e, comunque, a portare a termine l'intervento chirurgico nella migliore sicurezza, ove necessario, anche modificando il programma terapeutico.

Note aggiuntive:

---

Ciò premesso **Dichiaro** di essere stato/a invitato/a a leggere con molta attenzione quanto riportato in questo scritto che corrisponde, peraltro, a quanto ampiamente spiegatomi oralmente. **Dichiaro**, altresì, di aver ben compreso il significato di quanto mi è stato esposto e di non avere ulteriori chiarimenti da avanzare oltre a quelli che mi sono stati già forniti.

Quindi, consapevolmente **Acconsento** **Non acconsento** al trattamento chirurgico propostomi, che verrà messo in atto dall'équipe di quest'Unità.

**Autorizzo** **Non autorizzo** inoltre i sanitari curanti, ove durante l'intervento chirurgico evidenziasse altre patologie non precedentemente diagnosticate a provvedere, secondo scienza e coscienza, alla cura di tali patologie, anche modificando il programma terapeutico prospettato e preventivamente concordato.

**Autorizzo** **Non autorizzo** l'utilizzo dei tessuti e/o organi eventualmente asportati durante il trattamento al fine di formulare una diagnosi isto-patologica, ma anche per procedure finalizzate al miglioramento delle conoscenze in campo scientifico. Inoltre, **Acconsento** **Non acconsento** che nel corso di procedure diagnosticate e/o terapeutiche vengano eseguite riprese filmate e/o fotografiche e che queste vengano utilizzate in ambito medico per migliorare le conoscenze scientifiche, nel completo rispetto della mia privacy.

Data.....

Firma del medico

Firma del/la paziente

